

Skemaer til monitorering af igangværende behandling med Dexfarm



Patient navn:

Køn:

Fødselsdato:

		Skema - udfyldes af læge:									
		Efterfølgende undersøgelser									
		Baseline værdi									
Dato											
Højde (cm) *											
Vægt (kg) *											
Blodtryk											
Puls											
Appetit											

* Albertsson-Wiklund K, Luo ZC, Niklasson A, Karlberg J (2002). Svenske befolkningsbaserede longitudinelle referenceværdier fra fødsel til 18 år for højde, vægt og hovedomkreds. Acta. Pædiatri 91(7). 739-54.

Appetitskema udfyldes af patient/værge:

Appetit****

Behandlings dag:	1.				2.				3.				4.				5.			
SULTEN																				
NORMAL APPETIT																				
LILLE APPETIT																				
INGEN APPETIT																				
	Morgen	Middag	Eftermid dag	Aften		Morgen	Middag	Eftermid dag	Aften		Morgen	Middag	Eftermid dag	Aften		Morgen	Middag	Eftermid dag	Aften	
Behandlings dag:	6.				7.				8.				9.				10.			
SULTEN	-																-			
NORMAL APPETIT																				
LILLE APPETIT																				
INGEN APPETIT																				
	Morgen	Middag	Eftermid dag	Aften		Morgen	Middag	Eftermid dag	Aften		Morgen	Middag	Eftermid dag	Aften		Morgen	Middag	Eftermid dag	Aften	

** Neuhauser, H. K., Thamm, M., Ellert, U., Hense, H. W., & Rosario, A. S. (2011). Blood pressure percentiles by age and height from nonoverweight children and adolescents in Germany. *Pediatrics* 127, e978-e988.

*** Wallis, L. A., Healy, M., Undy, M. B., & Maconochie, I. (2005). Age related reference ranges for respiration rate and heart rate from 4 to 16 years. *Arch. Dis. Child* 90, 1117-1121.

**** Mattes, R. D. (2010). Hunger and thirst: issues in measurement and prediction of eating and drinking. *Physiol Behav*. 100, 22-32.